


N M N

BIBLIOTHEEK



7 7496 00042338 2

NATIONAAL NATUURHISTORISCH MUSEUM Postbus 9517 2300 RA Leiden Nederland

P L A N T Æ

R A R I O R E S

V I V I S C O L O R I B U S

D E P I C T Æ

Λ

N I C O L A O M E E R B U R G,

H O R T U L A N O I N A C A D E M I A

L U G D U N O B A T A V A.



L U G D U N I B A T A V O R U M,
A P U D J A C O B U M M E E R B U R G,

M D C C L X X X I X.



P R Æ F A T I O.

A longo tempore occupatus in examinandis & delineandis plantis, quæ mihi rariores videbantur, & quarum observandarum egregiam occasionem offerebat Hortus Academicus, tentavi anno septuagesimo quinto primam decadem iconum, propria manu æri incisarum, & naturalibus coloribus depictarum, in lucem emittere; non plane displicuere mea conamina, sic ut, a variis excitatus, quinque decades ab eo tempore ediderim. Finem autem nunc operi impoliturus, novas quinque superaddidi tabulas, indicemque tum plantarum, tum papilionum, quas cuique plantæ superaddidi, delineatas ad specimina, quæ in mea Collectione adservantur.

Nomina plantarum omnia desumpta sunt a Celeberrimo Linnæo, °cujus scripta itaque varia etiam citavi, simili modo progressus in descriptione papilionum.

P R Æ F A T I O.

Pleræque, si non omnes, quas hæcce Collectio continet, plantæ ab aliis depictæ non sunt, faltem, quantum scio, non eo tempore, quo ipse eas in lucem emisi, licet multæ ex iis, ex communicatis annotationibus Clarissimi D. van Royen, in Linnæanis operibus memorantur; &, quum ex sola descriptione easdem non facile cognoscere datur, aliquam faltem utilitatem in delineandis illis attulisse mihi videor, gavius, si peritis in arte non plane displicuerint. Id velim attendant, veritati me magis studuisse, quam tabularum nitori, quem etiam ab homine, qui, a nemine edoctus, sola exercitatione, in arte cælandi parum versatus est, expectare non licet.

IASMINUM (*Grandiflorum*) TAB. I.

IASMINUM (*Grandiflorum*) foliis oppositis pinnatis; foliolis extimis confluentibus. Linn. Sp. pl. p. 9.

IASMINUM (*Grandiflorum*) hispanicum magno flore externe rubente. Linn. Mantiss. 11. 316.

PAPILIO (*Helenus*) TAB. I.

PAPILIO (*Helenus*) alis caudatis nigris: posticis macula alba: subtus tribus albidis lunulisque septem ferrugineis. Linn. Syst. Nat. 745.

HEDYOTIS (*Herbacea*) TAB. II.

HEDYOTIS (*Herbacea*) foliis lineari-lanceolatis, caule herbaceo dichotomo, pedunculis geminis. Linn. Sp. pl. pag. 147.

PAPILIO (*Polydamas*) TAB. II.

PAPILIO (*Polydamas*) alis dentatis nigris fascia interrupta flava, posticis subtus maculis linearibus flexuosis rubris. Linn. Syst. Nat. 747.

SALVIA (*Paniculata*) TAB. III.

SALVIA (*Paniculata*) foliis obovato-cuneiformibus denticulatis nudis, caule frutescente. Linn. Syst. Nat. (2) Mantiss. pag. 25.

PAPILIO (*Polydamas*) TAB. III.

PAPILIO (*Polydamas*) subtus conspecta; hujus alæ supra fascia lutea è maculis parallelis sagittatis; posticarum margo subtus maculis 7, linearibus, fluxuosis (3) Coccineis.

COMMELINA (*Africana*) TAB. IV.

COMMELINA (*Africana*) corollis inæqualibus, foliis lanceolatis glabris, caule decumbente. Linn. Sp. pl. p. 60.

PAPILIO (*Troilus*) TAB. IV.

PAPILIO (*Troilus*) alis caudatis nigris: primoribus punctis marginalibus pallidis; posticis subtus maculis fulvis. Linn. Syst. Nat. 747.

HYOSCYAMUS (*Phyfalodes*) TAB. V.

HYOSCYAMUS (*Phyfalodes*) foliis ovatis integerrimis, calycibus inflatis subglobosis. Linn. Sp. pl. p. 258.

PAPILIO (*Mnemofyne*) TAB. V.

PAPILIO (*Mnemofyne*) alis oblongis integerrimis albidinigro-nervosis; primoribus maculis duabus nigris marginalibus. Linn. Syst. Nat. 754.

DAIS (*Cotinifolia*) TAB. VI.

DAIS (*Cotinifolia*) Linn. Sp. pl. pag. 556.

PAPILIO (*Piera*) TAB. VI.

PAPILIO (*Piera*) alis oblongis integerrimis albis nigro-nervosis: primoribus maculis duabus nigris marginalibus. Linn. Syst. Nat. 754.

MARTYNIA (*Longiflora*) TAB. VII.

MARTYNIA (*Longiflora*) caule simplici, foliis orbiculatis repandis. Linn. Syst. Nat. (2) 412.

PAPILIO (*Troilus*) TAB. VII.

PAPILIO (*Troilus*) subtus conspecta. Linn. Syst. Nat. 746.

SELAGO (*Tomentosa*) TAB. VIII.

SELAGO (*Tomentosa*) racemis ramosis, foliis ovatis crenatis tomentosis caule prostrato. Linn. Sp. pl. p. 877. n. 7.

MANULEA (*Tomentosa*) TAB. VIII.

MANULEA (*Tomentosa*) foliis tomentosis, caulibus foliosis, pedunculis multifloris. Linn. Mantiss. 11. pag. 420.

PAPILIO (*Pammon*) TAB. VIII.

PAPILIO (*Pammon*) subtus conspecta alis caudatis nigris concoloribus omnibus margine maculatis; posticis fascia maculis septem albis. Linn. Syst. Nat. 746.

CROTON (*Lobatum*) TAB. IX.

CROTON (*Lobatum*) foliis inermi-ferratis: inferioribus quinque lobis; superioribus trilobis. Linn. Sp. pl. p. 1427. Nostra species semper habet folia trifida, caulemque pilosum.

PAPILIO (*Demophon*) TAB. IX.

PAPILIO (*Demophon*) alis dentatis: supra fascia viridi sub-
tus griseo marmoratis. Linn. Syst. Nat. 753.

IMPATIENS (*Capensis*) TAB. X.

Planta annua, sub dio laete crescens, ad altitudinem quatuor
pedum, caules lucide rubescunt, geniculatae, stabiles, ra-
mi alterni teretes, flores lutei intus rubro maculati;

Habitus Impatientis Noli - tangere.

Habitat ad Promontorium Bonae. Sp.

PAPILIO (*Seclator*) TAB. X.

PAPILIO (*Seclator*) alis integerrimis, primoribus supra
fuscis fasciaque dilutiore transversali: inferioribus nigris,
postice albo coeruloque punctatis.

Magnitudo ut in icone. Abdomen & Corpus nigra, alae pri-
mores supra fuscâ fasciâ integerrima transversali per medium.
Subtus margo niger ad mediam alam fuscus, cæterum ala
flava, fasciâ per medium angusta transversali nigro termina-
ta: alae secundariæ ad abdomen supra fuscæ, cæterum ni-
græ, versus exteriorem partem, atræ, maculis albis coeru-
lescentibusque sparsis irregularibus variæ, subtus flavæ, ver-
sus marginem fuscæ, per medium transversa fascia flava ni-
gro-circumscripta ornata, quo colore reliqua alae pagina
tincta est. Versus marginem superiorem viride flavescences
& ad basim punctulis ternis concoloribus, atque ante fasciam
ocellis geminis nigris conspicuæ.

VERONICA (*Hispanica*) TAB. XI.

VERONICA (*Hispanica*) spicis terminalibus, foliis sublinearibus pinnatifido-acute dentatis. Planta perennis. Caules filiformes, quas folia ambiunt oblongiuscula subaequalia, sublinearia, acute pinnatifido-dentata: denticuli divergentes recurvati, ad summmitatem quandoque terna, quandoque omnino nulli.

Corollae tubulosae, tubus longitudinem calycis aequans, laciniae coeruleescentes, stamina lutescentia, antherae violaceae.

Habitat in Hispania.

PAPILIO (*Demophon*) mas. TAB. XI.

PAPILIO (*Demophon*) alis dentatis: supra nigris fascia viridi, subtus griseo marmoratis Linn. Syst. Nat. 753.

CELASTRUS (*Lucidus*) TAB. XII.

CELASTRUS (*Lucidus*) foliis ovalibus nitidis integerrimis marginatis. Linn. Syst. Nat. 181. Mantiss. 49.

Habitat ad Cap. b. spei.

Frutex erectus: Ramis fuscis, duris; folia alterna, ovata s. obovata, obtusiuscula, venosa, lucida, brevissime petiolata, margine integerrimo reflexo.

Pedunculi axillares, conferti, simplices folio breviores.

Petala concava, stamina corollâ breviora, stylis crassis, stigmata tria divergentia.

PAPILIO (*Demoleus*) TAB. XII.

PAPILIO (*Demoleus*) alis dentatis fuscis: maculis fasciaque maculosa flavis; posticis ocellis binis. Linn. Syst. Nat. 753.

AMARYLLIS (*Undulata*) TAB. XIII.

AMARYLLIS (*Undulata*) spatha multiflora. Corol-

lis patulis , petalis undulatis mucronatis basi dilatatis.
Habitat ad Promontorium Bonae Spei.
Scapus cum umbella magnitudine umbellae cum pedunculo
geranii zonalis. Spatha profert circiter 12. flores purpu-
reos , petalis angusto-lanceolatis , apice valde mucrona-
tis; basi ipsa ovata, stamina declinata. Linn. Syft. Nat. 237.

PAPILIO (Hecabe) TAB. XIII.

PAPILIO (*Hecabe*) alis integerrimis rotundatis flavis ex-
timo nigris: singulis subtus punctis pallidis numerosissimis
Linn. Syft. Nat. 763.

BROWALLIA (Elata) TAB. XIV.

BROWALLIA (*Elata*) pedunculis unifloris multifloris-
que. Linn. Sp. pl. pag. 880.

Habitat in Peru.

Simillima B. demissae , sed caulis duplo major , rigidus ,
crassitie dimidii digiti , quasi fruticosus; Rami inferiores
longitudine fere ipsius caulis , quod non in demissa.

Folia floralia huic fere glabra. Pedunculi alii uniflori , alii
triflori , quinqueflori & ultra , corolla faterate cocruleo-
violacea , nec dilute violacea.

BROWALLIA haec est simillima B. demissae , distincta
tamen ab ea caule stricto quasi lignosa Linn. Mantiss. (2)
421.

PAPILIO (Ulysses) TAB. XIV.

PAPILIO (*Ulysses*) subtus conspecta. Linn. Syft. Nat. 748.

BROWALLIA (Demissa) TAB. XV.

BROWALLIA (*Demissa*) pedunculis unifloris. Linn. Sp.
pl. pag. 879.

PAPILIO (Demophon) Mas. TAB. XV.

PAPILIO (*Demophon*) subtus Conspecta Linn. Syft. Nat. 753.
CY-

CYTISUS (*Æthiopicus*) TAB. XVI.

CYTISUS (*Æthiopicus*) racemis lateralibus strictis, ramis angulatis, foliolis cuniformibus. Linn. Sp. pl. p. 1042.

PAPILIO (*Scylla*) TAB. XVI.

PAPILIO (*Scylla*) alis subintegerrimis rotundatis fulvis: primoribus supra albis limbo nigro; subtus omnibus nebulosis. Linn. Syst. Nat. 763.

CROTALARIA (*Quinquefolia*) TAB. XVII.

CROTALARIA (*Quinquefolia*), foliis quinatis Wellia-tandale-cotti. Rheed. mal. 9. p. 51. t. 28. fig. mala.

Foliola angusta lanceolata, obtusa, saepe retusa, subnuda lateralibus brevioribus, calyces campanulati. Flores racemosi alterni glabri. Linn. Sp. pl. pag. 1006.

Obs. In nostra planta folia ima sunt simplicia; paulo altiora sunt terna, adhuc quae altiora sunt quaterna fiunt, donec suprema quinquefida existunt; unde triviale nomen Cl. Linnaeus desumpsit.

PAPILIO (*Melpomene*) TAB. XVII.

PAPILIO (*Melpomene*) alis oblongis integerrimis nigris: primoribus fascia rubra; posticis basi subtus punctis sanguineis. Linn. Syst. Nat. 758.

BALTIMORA (*Recta*) TAB. XVIII.

CHRYSANTHEMUM Americanum, caule alato, amplioribus foliis binatis, floribus pallide lutescentibus parvis. Pluk. mant. 46. t. 342. f. 3.

Habitat in Marilandia, ad urbem Baltimore. O. H. U.

Caulis bipedalis, tetragonus, erectus, viridis: lateribus profunde canaliculatis: angulis scabris: rami laterales brevissimi.

Folia opposita, petiolata, ovata, acuminata, ferrata, triner-
via, patentia, subtomentosa, pilis brevissimis, sericeis;
antiquioribus scabra.

Paniculae terminales, parvae, flores lutei. Corollulae disci
tomentosae antheris nigris. Linn. Mantiss. (2). 288.

PAPILIO (*Philoctetes*) TAB. XVIII.

PAPILIO (*Philoctetes*) alis subcaudatis fuscis; posticis ocel-
lis duobus coeruleis pupilla nigra punctisque tribus albus.
Linn. Syst. Nat. 750.

Alae Primores, subtus fascia lineari alba & linea transversa
atra baseos: Posticae punctis. 3. albis & maculis 2. violaceis.

COREOPSIS (*Lanceolata*) TAB. XIX.

COREOPSIS (*Lanceolata*) foliis lanceolatis, integerri-
mis ciliatis. Linn. Sp. pl. pag. 1283.

Obs. in nostra planta folia infima semper ternata existunt.

PAPILIO (*Aeneas*) TAB. XIX.

PAPILIO (*Aeneas*) alis dentatis atris primoribus supra macula
viridi; posticis macula palmata sanguinea Linn. Syst. Nat. 747.

LOBELIA (*Minuta*) TAB. XX.

LOBELIA (*Minuta*) foliis radicalibus ovatis scapis capillaribus.
Habitat in cap. b. spei subaquosis ☉.

Planta minuta (uti *Cameraria* & *Bellium minutum*) pollicaris.
Radix filiformis propaginibus repens. Folia radicalia, obo-
vata, obtusa, tenera, vix crenata, longius petiolata. Sca-
pus setaceus, bipollicaris, erectus, aphyllus, uniflorus. Ca-
lyx oblongus, lanceolatus, erectiusculus; Corolla infundi-
biliformis. Capsula infera oblonga. Affinis *Lobeliae* Lau-
rentiae sed tenerior, nec ulla bractea in scapa, a *L. Erino*
differt caule nullo. Linn. Mantiss. (2) 192.

PAPILIO (*Ulysses*) TAB. XX.

PAPILIO (*Ulysses*) alis dentatis nigris disco coeruleo ra-
diantes; posticis subtus ocellis septem. Linn. Syst. Nat. 748.

BOERHAVIA (Scandens) TAB. XXI.

BOERHAVIA (*Scandens*) caule erecto floribus diandris,
foliis cordatis acutis.

Caulis 6. pedalis, strictissimus, rectus, lævis.

Folia cordata, glabra.

Umbellæ sexfloræ: involucrum 5. phyllum, deciduum.

Corolla diandra, viridescens Linn. Mantiss. (2) 315.

Valerianella curassavica, femina aspera viscosa.

Pluk. alm. 349. t. 113. f. 7.

Solanum bacciferum americanum, fructu corymboso.

Pluk. alm. 349. t. 226. f. 7.

Perperam hæc binas icones Pluknetii huic speciei Cl. Lin-
næus applicavit. Prior male depicta a Pluknetio; posterior
aliam plantam exhibet.

Nostri species semper habet umbellas multifloras.

PAPILIO (Thoas) TAB. XXI.

PAPILIO (*Thoas*) alis caudatis: supra nigris: fasciis dua-
bus flavis interruptis, subtus flavis fascia cœrulea. Linn.
Mantiss. (2) 536.

ANAGALLIS (Latifolia) TAB. XXII.

ANAGALLIS (*Latifolia*) foliis cordatis amplexicaulibus,
caulibus compressis. Linn. sp. pl. 212.

Cruciata montana minor flore cœruleo Barr. ic. 584. fig. mala.

PAPILIO (Ricini) TAB. XXII. Mas. & Femina.

PAPILIO (*Ricini*) alis oblongis integerrimis fuscis: primo-
ribus utrinque fasciis duabus flavis. Linn. Syst. Nat. 756.

SAXIFRAGA (Stolonifera) TAB. XXIII.

Foliis ovato-rotundatis, dentatis, crassis primoribus sub-
tus rubris caule thyrsi floro: scapo aphylo.

Cal. persistens monophyllus, 5. partitus, patens, laciniis
ovatis acutis tribus: superioribus minoribus.

Cor. irregularis 5. pedata, pentaphylla, petalis tribus supe-
rioribus ovatis surrectis, planis, maculis roseis inferioribus
duabus deflexis, triplo majoribus, immaculatis niveis; ne-
ctar. coronula glandulosa.

Stam. fil. decem filiformia antheræ parvæ bilobæ caducæ.

Pist. germ. duo ovata, styli duo, stigmata parva obtusa.

Habitat in Virginia.

PAPILIO (*Polymnia*) TAB. XXIII.

PAPILIO (*Polymnia*) alis oblongis integerrimis luteis; primoribus fascia flava; posticis fasciis tribus nigris. Linn. Syst. Nat. 755.

RIBES (*Cynosbati*) TAB. XXIV.

RIBES (*Cynosbati*) aculeis subaxillaribus, baccis aculeatis racemosis. Linn. Sp. pl. pag. 292.

Facies R. Uvæ crispæ, folia parum fissa. Aculeis instar spinæ sub alis Pedunculi sæpius triflori. Germen inflore hispidum, nec aculeatum. Corolla R. Grossulariæ Baccæ magnitudine nucis coryli undique armatæ aculeis robustis.

PAPILIO (*Psidii*) TAB. XXIV.

PAPILIO (*Psidii*) alis oblongis integerrimis fuscis; primoribus fasciis tribus; posticisque duabus hyalinus. Linn. Syst. Nat. 756.

PÆONIA (*Tenuifolia*) TAB. XXV.

PÆONIA (*Tenuifolia*) foliis linearibus multipartitis. Linn. Sp. pl. pag. 748.

Radix repens. Folia Delphinii grandiflori S. Anthoræ, supra decomposita multipartita in lacinias numerosas, linearis lævis. Flos terminalis P. officinalis sed minor, pedunculatus solitarius. Caulis neque ramosus. Verbo quasi Filiæ Pæoniæ, ex Adonide apennina.

PAPILIO (*Pasithoe*) TAB. XXV.

PAPILIO (*Pasithoe*) alis nigris albo subradiatis puncto centrali albo; posticis subtus luteis basi cruentatis. Linn. Syst. Nat. 755.

SIDERITIS (Hirsuta) TAB. XXVI.

SIDERITIS (*Hirsuta*) foliis lanceolatis obtusis dentatis pilosis, bracteis dentato spinosis, caule hirsuto, spicis interruptis elongatis. Linn. Sp. pl. pag. 803.

Caulis, rigidus, pilosus, folia lanceolata, obtusiuscula, rugoso-plicata, ferraturis 3. S. 4. subacutis. Bractearum cordatarum ferrato-spinosarum. Verticilli remotissimi, sessiles, sexflori, caule inter verticillos hirsutiores. Corolla flava tubo incurvo; Labio superiore lineari, semibifido, reflexo, erecto, niveo L inferiore minimo, calyces hirti, spinis 5. æqualibus, stamina intra tubum.

PAPILIO (Orestes) TAB. XXVI.

Alis posticis rotundatis subdigitatis, omnibus nigris utrinque fascia lata continua flava inferioribus maculatis, varie coloratis. Centrum omnium alarum occupat fascia continua lata, amœna flavicans, alarum secundarum supra seriebus binis margini parallelis ex maculis lunulatis cordiformibusque flavis infra alarum secundarum ab articulo usque ad medium flavarum, cæterum atrarum seriebus, tribus, parallelis margini ex maculis cordiformibus, ac lunulatis; harum prior series rubro tincta, media cœrulea & extremo flavo est, reliquum corpus & alarum nigerrimo colore umbruuntur.

SIDERITIS (Perfoliata) TAB. XXVII.

SIDERITIS (*Perfoliata*) herbacea hispido-pilosa, foliis superioribus amplexicaulibus Linn. Sp. pl. pag. 802.

Caulis erectus, herbaceus, Folia inferiora caulis petiolata, superiora sessilia, opposita, amplexicaulia. Floralia cordata, integerrima, acuminata; corollæ albæ venis aliquot rufis.

PAPILIO (Echion) TAB. XXVII.

PAPILIO (*Echion*) alis bicaudatis supra fuscis; subtus pallescentibus: fascia rufa ocelloque terminali rubro. Linn. Syst. Nat. 788.

SIDERITIS (*Lanata*) TAB. XXVIII

SIDERITIS (*Lanata*) foliis cordatis obtusis villosis, calycibus muticis lanatis, spica longa, caule erecto. Linn. Sp. pl. pag. 804.

Planta spithamœa, erecta, tota lanata. Caulis simplicissimus. Folia cordata, subsessilia, obsolete crenata, obtusa, spica longior ipso caule, sessilis, terminalis e Verricillis sexfloris, remotis, valde lanatis. Corollæ atrovioleæ, longitudine calycis, Bractææ ovatæ, obsolete ferratæ, lanatæ.

PAPILIO (*Chrysippus*) TAB. XXVIII.

PAPILIO (*Chrysippus*) alis integerrimis fulvis margine nigro punctis albis, posticis disco punctis nigris Linn. Syst. Nat. 767.

LOTUS (*Arabicus*) TAB. XXIX.

LOTUS (*Arabicus*) leguminibus cylindricis aristatis, caulibus prostratis, pedunculis trifloris, bracteis monophyllis. Linn. Mantiss. 104.

Pedunculi primi uniflori sunt.

PAPILIO (*Teucer*) TAB. XXIX.

PAPILIO (*Teucer*) alis subrepandis lividiusculis, subtus nebulosis; posticis ocellis tribus: postremo maximo. Linn. Syst. Nat. 753.

BALTIMORA (*Alata*) TAB. XXX.

Caule alato decurrens foliis oppositis lato lanceolatis pedunculatis acuminatis ferratis.

Crescens ad 8. pedum altitudinem Coreopsis alternifoliam simulans.

Habitat in america septentrionali.

PAPILIO (*Orestes*) TAB. XXX. Subtus conspecta.

ARALIA (*Nudicaulis*) TAB. XXXI.

ARALIA (*Nudicaulis*) caule nudo, foliis binis ternatis
Linn. sp. pl. pag. 393.

Christophoriana, Virginiana zarzæ radicibus furculosis & fungosis. Pluk. alm. 98. t. 238. fig. 5. fig. mala.

PAPILIO (*Euterpe*) TAB. XXXI.

PAPILIO (*Euterpe*) alis oblongis integerrimis nigris albo-punctatis fascia fulva. Linn. Syst. Nat. 756.

TRADESCANTIA (*Cristata*) TAB. XXXII.

TRADESCANTIA (*Cristata*) repens lævis spathis diphyllis imbricatis. Linn. Syst. Nat. 3. pag. 233.

Commelina cristata sp. pl. pag. 64.

Radix annua, caules teretes, læves, ramosi, diffusi, repentes, folia lanceolata recurvata, lævia, basi vaginantia, vaginis striatis, spathæ imbricatæ, diphyllæ, bifloræ, floribus sessilibus, lunatæ, sexparium, secundæ Cal. corolla brevior. Petala 3. ovata, sessilia, cœrulea filamenta pilosa extus; pilis cœruleis articulatis. Stylis clavatis stigma tubulosum, crenatum.

PAPILIO (*Agenor*) TAB. XXXII.

PAPILIO (*Agenor*) alis dentatis nigris basi sanguineis: primoribus striatis; posticis disco albo maculis nigris. Linn. Syst. Nat. 747.

OENOTHERA (*Fruticosa*) TAB. XXXIII.

OENOTHERA (*Fruticosa*) foliis lanceolatis subdentatis, capsulis pedicellatis acutangulis, racemo pedunculato
Linn. sp. pl. p. 492.

Calyx purpurascens, tetraphyllis, sed rumpitur altero sæpius & unico latere. Tubus filiformis, angustissimus, capsula angulis 4 acutis compressis folia rarius denticulata.

PAPILIO (*Cardamines*) TAB. XXXIII.

PAPILIO (*Cardamines*) alis integerrimis rotundatis albis: primoribus medio fulvis; posticis subtus viridi nebulosis
Linn. Syst. Nat. 761.

OENOTHERA (Parviflora) TAB. XXXIV.

OENOTHERA (*Parviflora*) foliis ovato-lanceolatis planis, caule lævi subvillosa. Linn. sp. pl. pag. 492.

Fructus apex coronatus margine octifido, nec quadrifido, uti OE. biennis, cui simillima. Caulis pilis adspersus, sed absque tuberculis ad eorum basin. Folia repanda-subdentata, minus mollia. Calyx tubo suo quadruplo brevior, infra apicem denticulo notatus, hinc ante explicationem mucrones in hac distantes Petalorum latera distantia, dimidio minora præcedentis petalis.

Capsulæ quadrivalves.

PAPILIO (Marfyas) TAB. XXXIV.

PAPILIO (*Marfyas*) alis bicaudatis supra cœruleis; subtus cœrulescentibus punctis nigris. Linn. Syst. Nat. 788.

OENOTHERA (Longiflora) TAB. XXXV.

OENOTHERA (*Longiflora*) caulibus simplicibus pilosis, petalis distantibus bilobis. Linn. Mantiss. 2. 227.

Folia Radicalia numerosa, lanceolata, denticulata, pubescentia costa alba, oblique nervosa.

Caules sæpius 5., enati infra folia radicalia, simplicissimi, adscendentes, hirti, virides, pilis longis, patulis albis.

Caulis centralis serius excrescit.

Folia caulina ovato oblonga, denticulata, sessilia, radicalibus similia.

Flores axillares superiorum foliorum, germine calyceque piloso.

Calyx tubo insigniter elongato, limbo suo triplo longior.

Petala 4, flava, obcordata, biloba, magnitudine OE. onagræ, si non majora, lateribus distantia; altero die rubra.

Fructus similes OE. onagræ, sed longior, inferne angustior, ore connivente minus scabro.

Differt ab OE. onagra, quæ foliis caulinis subnudis, subpetiolatis, caule erecto, ramis lateralibus, vix manifeste pilosis - Petalis approximatis, vix emarginatis, nec bifidis; calycis tubo vix laciniis duplo longiore.

PA-

PAPILIO (Dido) TAB. XXXV.

PAPILIO (*Dido*) alis dentatis oblongis nigris viridi maculatis, posticis fascia maculisque septem transversis cœrulescentibus. Linn. Syst. Nat. 782.

SAPONARIA (Porrigen) TAB. XXXVI.

SAPONARIA (*Porrigen*) calycibus cylindricis pubescentibus, ramis divaricatissimis, fructibus pendulis. Mantiss. (2) 239.

Silene porrigens Syst. 3. p. 230.

Lychnis chalepensis annua, foliis parum hirtis angustis, flosculis carneis, pediculis infirmis biuncialibus capsulis fere rotundis Moris. hist. 3. p. 541. fig. mala.

Caulis bipedalis, erectus, articulatus, rigidulus, inferne glaber, superne pubescenti viscidus ramis divaricatissimis.

Folia lanceolata: inferiora glabra; superiora sub ramificationibus pubescentia viscida.

Pedunculi axillares, solitarii uniflori, capillares, laxi patentes glabri, longitudine foliorum, dum fructiferi penduli.

Calyx oblongus, tubulosus, pubescenti-viscidus.

Petala absque corona, subincarnata, emarginata laciniis brevibus Stam. alba, tubo breviora, Germen ovatum. Styli distantes.

Stigmata simplicia.

Obs. Deleatur inter *Silenes*; substituatur hæc descriptio e viva.

PAPILIO (Daplidice) TAB. XXXVI.

PAPILIO (*Daplidice*) alis integris rotundatis albis margine fuscis. subtus luteo griseis albo maculatis Linn. Syst. Nat. 760.

CODON (Royeni) TAB. XXXVII.

Cal. perianthium monophyllum, decempartitum foliolis subulatis, persistentibus erectiusculis: alternis brevioribus.

Cor. monopetala campanulata basi torulosa: Limbo decempartito æquali, Nectarium decem loculare ex squamis 10. unguibus staminum infertis, conniventibus, receptaculum tegentibus.

Stam. filamenta decem, longitudine corollæ. Antheræ crassæ.

Pist. Germen superum conicum, stylus simplex, longitudine staminum, stigmata duo, longa, setacea, divergentia.

Per. biloculare.

Sem. plura subrotunda hirta in pulpa exsucca colorata.

Caulis herbaceus, firmus, cubitalis, teres ramis affurgentibus, folia alterna petiolata cordata ovata, subrepanda, indivisa, acuminata, subcoriacea glabra supra avenia, Flores supra axillares, solitarii, pedunculati, facies corollæ Atropæ Belladonnæ albidi, extus notati striis 10. purpurascentibus Herba tota adspersa striis Royeni Linn. Syst. Nat. 3. 292.

PAPILIO (Marfyas) TAB. XXXVII.

PAPILIO (*Marfyas*) (subtus conspecta) Linn. Syst. Nat. 788.

THEA (Bohea) TAB. XXXVIII.

THEA (*Bohea*) floribus hexapetalis Linn. sp. pl. pag. 734.

PAPILIO (Hippothoe) TAB. XXXVIII.

PAPILIO (*Hippothoe*) alis integerrimis supra fulvis immaculatis; subtus cinerascentibus: punctis ocellaribus nemorosis. Linn. Syst. Nat. 793.

SENECIO (Chrysocoma) TAB. XXXIX.

Corollis nudis foliis longioribus linearibus, prælongis.

Habitat ad Promontorium bonæ spei.

Planta fruticosa floribus corymbosis, folia, priora in planta juniore sunt folia coronopi.

PAPILIO (Clio) TAB. XXXIX.

PAPILIO (*Clio*) alis oblongis integerrimis fuscis: primoribus albo maculatis; posticis fascia alba Linn. Syst. Nat. 751.

GORTERIA (Araneosa) TAB. XL.

Foliis integris dentato spinosis, amplexicaulibus, ramis alternis, floribus pedunculatis luteis subtus violaceis.

Habitat ad Promontorium bonæ spei.

PAPILIO (Anthilochus) TAB. XL.

PAPILIO (*Anthilochus*) alis caudatis concoloribus flavis: facciis margineque nigris, caudis albis longitudine alæ Linn. Syst. Nat. 751.

CYANNELLA (Capensis) TAB. XLI.

Cor. Hexapetala petalis 3. inferioribus propendentibus stamen infimum declinatum longius. Linn. Syst. Nat. 243.

Videt. plukt. phyt. 434. fig. mala.

PAPILIO (Polyxena) TAB. XLI.

PAPILIO (*Polyxena*) alis caudatis, supra purpureo nigra, alis promoribus, maculis albis duabus minimis subtus nebulosis.

Habitat in America.

SOPHORA (Tinctoria) TAB. XLII.

SOPHORA (*Tinctoria*) foliis ternatis subsessilibus foliolis obovatis glabris. Linn. Sp. pl. pag. 534.

PAPILIO (Ulysses) TAB. XLII.

PAPILIO (*Ulysses*) alis caudatis nigris disco coeruleo radiante; posticis subtus ocellis septem. Linn. Syst. Nat. 748.

Alæ primores atræ: a basi ad medium macula cœrulea septem-dentata: maculis 7 fuscis lanceolatis parallelis in parte alarum nigra simul aream cœruleam intrantibus.

ROYENA (Villosa) TAB. XLIII.

ROYENA (*Villosa*) foliis cordatis oblongis subtus tomentosis.

Simillis Royena lucida sed rami villosi Folia elliptica, oblongo, basi cordati subtus tomentosa, obtusiuscula, breviter petiolata petiolis villosis, Flores axillares, nutantes, solitarii pedunculis villosis longitudine florum Bractæ 2, oppositæ, ovatæ, acutæ, pubescentes, calyce majores eo-que subjectæ deciduæ. Linn. Syst. Nat. T. 2. pag. 302.

Habitat. ad. cap. b. spei.

PAPILIO (*Kollina*) TAB. XLIII.

PAPILIO (*Kollina*) alis angulatis dentatis nigris , primoribus omnibus supra maculis cœrulea.

Magnitudine. Pap. Polychloros.

Habitat in Asia: China.

LYTHRUM (*Petiolatum*) TAB. XLIV.

LYTHRUM (*Petiolatum*) foliis oppositis linearibus petiolatis , floribus dodecandris. Linn. Sp. pl. 641.

Anonymos flore purpureo ringenti , galea bipartita labio quadripartito seminibus vasculoso inclusis , caule viscoso.

Florem habit tenerum & citissime marcescentim , mane solummodo conspicuum Clayt. n. 418.

Folia lanceolata , opposita , integerrima , caulis pubescens viscosus Flos ex singula ala solitarius , calyx tubulosus , oblongis , ventricosus , ore obsolete minimo sexifido.

Petali sex , tenuia oblongo. Stamina duodecim , sex ad singulum latus.

Pistillum unicum. Stigma capitatum.

Cuphea erecta foliolis oblongis - ovatis oppositis spicatis terminalibus. Brown. jam. 216.

PAPILIO (*Philea*) TAB. XLIV.

PAPILIO (*Philea*) alis integerrimus angulatis flavis : primoribus macula ; posticis limbo luteis Linn. Syst. Nat. 764.

TEURIUM (*Cubense*) TAB. XLV.

TEURIUM (*Cubense*) foliis ovatis incisfis glabris subcuneatis , floribus solitarius pedunculatis Linn. Mantiss. pl. pag. 80.

Habitat in cubæ humidiusculis.

Caulis erectus , glaber , inodorus. Flores albi.

PA-

PAPILIO (*Dirce*) TAB. XLV.

PAPILIO (*Dirce*) alis angulatis fuscis, primoribus fascia flava: subtus nigro undulatis Linn. Syst. Nat. pag. 778.

ALYSSUM (*Hyperboreum*) TAB. XLVI.

ALYSSUM (*Hyperboreum*) foliis incanis dentatis, staminibus quatuor bifurcatis. Linn. Sp. pl. pag. 910.

Lunaria foliis ellipticis incondite denticatis Kraschen. act.

Petr. 1747. p. 381. t. 15. fig. 1. mala.

Stamina 2. breviora ungue acuto notata, reliqua 4. ad basin squama emarginata.

PAPILIO (*Bixæ*) TAB. XLVI.

PAPILIO (*Bixæ*) alis rotundatis fuscis basi viventibus: posticis subtus fascia lactea. Linn. Syst. Nat. 795.

Pap. Mas. sæpe caudata.

OTHONNA (*Tagetis*) TAB. XLVII.

OTHONNA (*Tagetis*) foliis linearibus pinnatis subdentatis, caule herbaceo. Linn. Sp. pl. 1309.

PAPILIO (*Phidias*) TAB. XLVII.

PAPILIO (*Phidias*) alis rotundatis atris nitentibus margine albis ore anoque rubris. Linn. Syst. Nat. 795.

CINERARIA (*Linifolia*) TAB. XLVIII.

CINERARIA (*Linifolia*) pedunculis unifloris foliis sparsis caule fruticosa. Linn. Spec. pl. 1244.

Caule fruticosus , compositus , scaber folia confertissima , linearia angustissima , virida pedunculis solitarii , uniflori , filiformes , foliis longioribus. Amœn. Acad. 6. afr. 82. Flores parvi lutei.

PAPILIO (Aonis) TAB. XLVIII.

PAPILIO (*Aonis*) alis angulatis griseis : primoribus flavescenti nebulosis : supra ocellis sesquialteris Linn. Syst. Nat. 769.

HELIANIHUS (*Angustifolius*) TAB. XLIX.

HELIANIHUS (*Angustifolius*) foliis alternis linearibus Linn. Sp. pl. 1279.

PAPILIO (*Quercus*) TAB. XLIX.

PAPILIO (*Quercus*) alis subcaudatis supra cœruleis ; subtus cinereis linea alba , puncto ani gemino fulvo. Linn. Syst. Nat. 788.

LEEAE (*Crispa*) TAB. L.

LEEAE (*Crispa*) caule angulato fimbriato. Linn. Mantiss. pl. 125.

Radix tuberosa , caulis sublignosus , annuus , articulatus ; tripedalis , angulis membranaceis crispis , Folia alterna , pinnata , rachi marginata : foliolis petiolulatis. 3. f. 5. ovali-oblongis , lineatis , glabris argute ferratis , nervis transversis , intertextis striis transversis parallelis. Stipulae solitariae , subfolia , feminulares , carina ciliata. Pedunculus corymbosus. Flores nivei exigui. Utriusque speciei. Nervi oppositi sunt.

PAPILIO (*Dejanira*) TAB. L.

PAPILIO (*Dejanira*) alis dentatis fuscis : primoribus utrinque ocellis quinque ; posticis sex fasciaque alba repanda. Linn. Syst. Nat. 774.

PÆNNÆA (*Longiflora*) TAB. LI. Fig. 1.

PÆNNÆA (*Longiflora*) foliis oppositis rhomboideis acutis floribus quadrifidis purpureis, tubo longissimo.

PÆNNÆA (*Cneorum*) TAB. LI. Fig. 2.

PÆNNÆA (*Cneorum*) foliis lanceolatis acutis.

PÆNNÆA (*Mucronata*) TAB. LI. Fig. 3.

PÆNNÆA (*Mucronata*) floribus parvis rubris foliis cordatis acuminatis. Linn. Sp. pl. pag. 162.

PAPILIO (*Caricæ*) TAB. LI.

PAPILIO (*Caricæ*) alis integerrimis fulvis disco communi albo, limbo cinereo ocellato. Linn. Syst. Nat. 792.

ECHIUM (*Capitatum*) TAB. LII.

ECHIUM (*Capitatum*) caule piloso floribus capitato corymbosis æqualibus, staminibus corollæ longioribus, foliis hispidis. Linn. Syst. Vegt. Sp. pl. pag. 189.

Caulis lignosus ramosus pilosus. Folia lanceolata, adspersa setis patulis, pellucidis, basi bulbosis.

Flores dense in capitula terminalia congesti. Corollæ regulares, infundibuliformes, vix Lycopsidis majores.

Stamina corollis & stylus staminibus duplo longior. Mantiss. Spec. Lin. pag. 42. D. Royen.

PAPILIO (*Amathea*) TAB. LII.

PAPILIO (*Amathea*) alis angulatis, supra fuscis albo punctatis, fascia rubra, linea nigra undata.

Linn. Syst. Nat. pag. 779.

CYRILLA (*Racemiflora*) TAB. LIII.

Caule ramisque compositis ex apicibus annotinis tantum ramosis. Folia alterna petiolata, exstipulata, lanceolata (Ligustri), integerrima, glabra, supra subtilissime venosa.

Racemi plures terminales, rami præcedentis anni penduli, spithamæi, bracteis fetaceis, longitudine pedicellorum.

Flores albi; Petala disco longitudinali villosa.

Difficile hæc arbor distinguitur. Sunt, qui illam Celastrum vocant; sunt qui Hirtillam dicunt: quæ hoc tempore Hortum Academicum ornat, mihi Cyrilla racemiflora videtur.

Mantiss. Spec. Linn. pag. 50.

PA.

PAPILIO (*Amathea*) TAB. LIII.

PAPILIO (*Amathea*). Linn. Syft. Nat. pag. 779.

STAPELIA (*Tuberosa*) TAB. LIV. Fig. 1.

STAPELIA (*Tuberosa*) Folia lanceolata undulata ciliata.
Radix fimillima radici Cyclaminis.

Char. cum Echitide multum convenit.

Habitat ad Caput Bonae spei.

COLUMNEA (*Humilis*) TAB. LIV. Fig. 2.

COLUMNEA (*Humilis*) foliis petiolatis dentatis, sæpe ternatis, subtus rubris, floribus rubris.

PAPILIO (*Tipha*) TAB. LIV.

PAPILIO (*Tipha*) alis subcaudatis nigris: primoribus maculis duabus: posticis disco rubro-emarginato albis.

Linn. Syft. Nat. pag. 776.

EUPHORBIA (*Procumbens*) TAB. LV.

Radix tuberosa extus rugosa, fusca, Cyclaminis radici similima.

Ramuli rariores nudi, lineis exarati, aculeis instructi procumbentibus. Habitat ad Cap. Bon. Spei.

D. Thunberg misit ad Hortum Lugd. Bat.

PAPILIO (*Oenone*) Tab. LV.

PAPILIO (*Oenone*) alis denticulatis, primoribus albido maculatis, subbiocellatis, posticis basicyaneis ocellis duobus
Linn. Syft. Nat. 770.

INDEX GENERUM PLANTARUM.

Alyffum.	Tab. 46.	Impatiens.	Tab. 10.
Amaryllis.	Tab. 13.	Leca.	Tab. 50.
Anagallis.	Tab. 22.	Lobelia.	Tab. 20.
Aralia.	Tab. 31.	Lotus.	Tab. 29.
Baltimora.	Tab. 18 — 30.	Lythrum.	Tab. 44.
Boerhavia.	Tab. 21.	Manulea.	Tab. 8.
Browallia.	Tab. 14 — 15.	Martynia	Tab. 7.
Celastrus.	Tab. 12.	Œnothera.	Tab. 33. 34. 35.
Cineraria.	Tab. 48.	Othonna.	Tab. 47.
Codon.	Tab. 37.	Pennæa.	Tab. 51.
Columnnea.	Tab. 54.	Poeonia.	Tab. 25.
Commelina.	Tab. 4.	Ribes.	Tab. 24.
Coreopsis.	Tab. 19.	Royena.	Tab. 43.
Croton.	Tab. 9.	Salvia.	Tab. 3.
Crotolaria.	Tab. 17.	Saponaria.	Tab. 36.
Cyanella.	Tab. 41.	Saxifraga.	Tab. 23.
Cyrilla.	Tab. 53.	Selago.	Tab. 8.
Cytifus.	Tab. 16.	Senecio.	Tab. 39.
Dais.	Tab. 6.	Sideritis.	Tab. 26. 27. 28.
Echium.	Tab. 52.	Sophora.	Tab. 42.
Euphorbia.	Tab. 55.	Stapelia.	Tab. 54.
Gorteria.	Tab. 40.	Teucrium.	Tab. 45.
Hediotis.	Tab. 2.	Thœa.	Tab. 38.
Helianthus.	Tab. 49.	Tradescantia.	Tab. 32.
Hyoscyamus.	Tab. 5.	Veronica.	Tab. 11.
Jasminum.	Tab. 1.		

INDEX PAPILIONUM.

Papilio. Helenus.	Tab. 1.	Papilio. Teucer.	Tab. 29.
—— Polydamus.	Tab. 2 — 3.	—— Euterpe.	Tab. 31.
—— Troilus.	Tab. 4 — 7.	—— Agenor.	Tab. 32.
—— Mnemosyne.	Tab. 5.	—— Cardeminis.	Tab. 33.
—— Piera.	Tab. 6.	—— Marfyas.	Tab. 34 — 37.
—— Pammon.	Tab. 8.	—— Dido.	Tab. 35.
—— Demophon.	Tab. 9 — 11 — 15.	—— Daplidice.	Tab. 36.
—— Sektator.	Tab. 10.	—— Hippothoc.	Tab. 38.
—— Demoleus.	Tab. 12.	—— Clio.	Tab. 39.
—— Hecabe.	Tab. 13.	—— Antilochus.	Tab. 40.
—— Ulyffus.	Tab. 14 — 20 — 42.	—— Polyxena.	Tab. 41.
—— Scylla.	Tab. 16.	—— Kollina.	Tab. 43.
—— Melpomene.	Tab. 17.	—— Philia.	Tab. 44.
—— Philoſtitis.	Tab. 18.	—— Dirce.	Tab. 45.
—— Æneas.	Tab. 19.	—— Bixæ.	Tab. 46.
—— Thoas.	Tab. 21.	—— Phldias.	Tab. 47.
—— Ricini.	Tab. 22.	—— Aonis.	Tab. 48.
—— Polymnia.	Tab. 23.	—— Quercus.	Tab. 49.
—— Pfidii.	Tab. 24.	—— Dejanira.	Tab. 50.
—— Paſithoe.	Tab. 25.	—— Caricæ.	Tab. 51.
—— Orefſtis.	Tab. 26 — 30.	—— Amatheæ.	Tab. 52 — 53.
—— Echion.	Tab. 27.	—— Tipha.	Tab. 54.
—— Chryſipus,	Tab. 28.	—— Oenone.	Tab. 55.

TAB I.



N. Klee, bürgerl. Zeichner

Plaat 1.

Melenius. Ridder-kapel, met gestarte rieten,
die zwart (of donkerbruin) zijn, de achtersten met een
witte vlak en van onderen drie witagtige, en zeren
ijzergrauwe (of oranjekeurige) maantje.
zie Houttuyn Natuurlyke Historie volgens Linnéus.
1 deel. 11de Stuk Plaatje 191 (a) en pl. 17. fig. 1.
woont in Asia

Alle de Kapellen. op de 55 platen van dit werk
afgebeeld, behooren volgens Linnéus tot de Dag-Kapellen.


TAB I.



Nickering's Lett



TABII



Plaat 2.

Polydama L. Ridderkapel, die de ricken getand en zwart of bruin heeft, met een afgebrooken geelen band, bestaande uit evenwijdige rijshwylse vlakken; de agterkten, van onderen, rood geleeckend. *Hoittuyn* ii buk bl. 195 (ii.) & *Sherian* *Surinaamseke* *insec-*
ten pl. 31. De *Rupl* aatt op de *chineesche* *Roos*. een boompje dat tot de *althia* betrokken wort in *America*. Deze *kapel* is van boren verbeeld zie dezelve van onderen op de volgende 3 plaat.

TABII



N. Morley's 1. f. 1.

TAB. III.



N. Meunier del. sculp.

Plaat 3

Polydamas Gizele Ridderkapel, die op de voorgaande
plaat van boven verbeeld is, van onderen te zien, zijnde
aldaar bruin met 5 gele vlakken, op de voorvleugels,
en 7 borstige rode vlakken op de achtervleugelen.
en volgens Linné met 7 lijnrecht loopende, en 3 borstige
vlakken, hoog-rood van kleur. Houtt. II Stuk Pl. 195 (ii)
Merian Sur. insecten pl 31.



N. Meenburgh fecit.

TAB. IV.



N. Meunier's Cat

Plaat 4

Troilus. Ridder kapel met gestaarle wicken die
zwart zijn, de voorhen gerand met agt en de
agtesfen met zeren bleike stippen, en twee geel
vlakken van boven te zien. *Hiüttuin II Huk II 192. (5)*
zie derelre van *anderen* plaat 7. wort on de *indien*

TAB. IV.



N. Meunier del.

TAB. V.



Plaat 5.

Mnemofyne. Een Fitchlandfche. kapel die tot de
Paarnaſ. Kapellen behoort, die de wicken ongekarteld,
langwerpig, wit met zwarte aderen heeft, de voorten
met twee zwarte vlakken aan den rand. Flouituyt
II. Stuk Pl. 229 (42.)

Deze afgebeelde kapel heeft drie vlakken op de
voor en twee op de agtervleugelen, en de binnen-rand
der agterſten mede zwart, en de buitenſten heeft
groenagtig.



N. Meemburg, scit.

B. VI



16. *Heurburg* forest

Plaat 6.

Piera. De Glat-kapel. een Jannat-kapel
die de wieken langwerpig, ingekarteld, als glat
doorschijnende heeft, de agtellen met twee
voegsel. Houttuyn II Stuk bl. 229. (43.)



H. Meunier del. & sculp.




Plaat. 7.

Troilus. Deze Ridder kapel van Coren afgebeeld
plaat 4. is van anderen alhier geteekend, bruin,
met twee reien witte stippen op de voorvleugelen, en
op de achteren een schoone blaauwen rand en zeeren
volgelede veld. (Zie Frederijds van dezelve uit de Indien
Houttuyn II Stuk Pl. 192. 5.)



TAB. III.



N. Meerburg's Scit


Plaat: P.

Pammon. Ridder-kapel, met gestaaite wicken,
die wederzyds zwart (of bruin) zijn, allen aan den
rand gerlakt, de agtersten met een band van
zeeren witte vlakken. Houttuyn II stuk Pl. 193. (P.)
woont in Arica

TAB. VII.



N. Meerburg fecit



TAB. IX



Plaat. 9.

Demophon. Ridderkapel die de wieken getand heeft, van boven zwart met een groenen band, van onderen graauw gemarmert. Houttuyn II. Stuk Pl. 210 (36.) zie Roet. 4 deel plaat 6. figuur 1. waan. (thynelyk + wijffe).

TAB. IX




N. Meemburgt fecit



Sectator. Een Nijf-Kapel, de voorsten wieken
van boven bruin met zwarte aderen, de agtsten
zwart met hemelsblauwe vlakken; van onderen
de vier vleugelen van 't lijf af geel met zwarte
aderen, met een breeden bruinen rand, en op
de agtsten twee zwarte oogen.
zie dezelve van boven vliegende en van onderen
zittende.



TAB XI



N. Meenburgh fecit.

Plaat 33

Demophon. + mannetje. Ridder kapel die de wieken
vondagtig heeft, van boven zwart met een blaauwen
band en twee blaauwe vlakjes aan de einden der
voorleugelen. Houttuyn II Pluk Pl. 210. (36.)
Linneus noemt de band groen
zie de rebr. kapel van onderen plaat 15.

TAB XI



N. Meernburg fecit.

B. XII.




W. Meenburch fecit.

Plaat 12.

Demoleüs. Ridder-kapel, die de ricken getand
 en bruin heeft, met geel vlakken, en een geel-
 slakkigen band, de agtsten ieder met twee
 oogen, of met een blaauw half maantje en
 een oranje-kleurig oogje. Plouff II. Pl. II. 217. (35.)
 Deze kapel is wij gemeen in China, en men
 heeft er ook verscheidenheden van in de indien
 en aan de Kaap.



W. Meerburch fecit



N. Meerburg fecit

Plaat 13.

Olicabe: een Danaïd-kapel, die de wieken
rond van rand en geel heeft; aan de buitenkant
zwart of bruin, van onderen met bleke stippen.
Dit is een soort van kleine geel witte uit China
of de oost-indië. Rottum II. Pluk. II. 266 (74.)





Plaat 14.

Vlijssus. Dit is een batterd vlijssus. Een Ridderkapel die de wicken van boven bruin heeft met een blaauwen band in t midden, en binnen den rand vele roode vlakjes, van onderen ligt bruin met geele vlakken, en wederzijds op de voorste wicken en op de achtersten a oopjes. Houttuyn II stuk. Bl. 201 (20.)
Deze kapel is alhier van onderen afgebeeld, en op plaat 20. van boven. maar de egte vlijssus op plaat 42.



N. Meunier & fecit



Plaat 15.

Demophore. 1 mannetje. een Ridder-kapel.
die de wieken rondagtig heeft, van boven zwart
met een blaauwen band en twee blaauwe vlakjes
aan de einden der voorleugelen, van onderen
grauw gemarmerd. en tussen den rand der
agtersten wieken rijt witte stippen, met een
rood-agtig vlakje. boven elke stip het vijfje
heeft twee oogjes. Flouttuyn II Stuk bl. 210. (36.)
Deze kapel is alhier van onderen afgebeeld,
zie dezelve van boven. plaat 11.

TAB XV





TAB XVI



at Newbury, N. H.

Plaat. 16.

Scijla. Oost-indische Boter-kapel. Danaüs-kapel
die de voortten wieken wit heeft, met een zwarten of
bruinen rand, de agtersten veel of boter-kleurig; van
onderen geheel geel, met bruine stippen. Houttuyn
" Stuk II. 256. als eene verscheidenheid van Damme
(69.) zie dezelve om hoog van de bovenzijde, en van
onderen aan de onderzijde afgebeeld.





N. Moenbuehl feat

Plaat 17.

Welpomene. Rood gelakte Parnas-kapel, die de
wicken langwerpig, ongekarteld, want heeft: van den
binnenkant een anderen rood, de waffen weder
zyds met een roden band. uit west-indiën.

Houttuyn II Pl. H. 235. (55.) zie Roefel A deel
plaat 3. figuur 6.





Plaat 10.

Philocletus. Ridderkapel die de wiken zwart
en bruin heeft, de agterflen van boven met
twee hemelich blaauwe vlakken, in t midden
zwart ge-oogd. Plouffe 11 stuk Pl. 220. (20.)
vandeze indische Kappel zyn de voorflen wiken
met vier witte stippen en drie paarschaglige
vlakken, van onderen met een rege witten band,
en een zwarten dwarsstreep aan den grond-staam:
de agterflen met zwarte stippen en twee witte
vlakken —



TAB. XVIII



Plaat 19.

Améas. Ridder-kapel, die de wiken
getand en zwart heeft; de rootten van
boren met een groenen vlak, de agter-
sten met een geringerde vlak, die rood is.

Houttuyn II Stuk. Pl. 190. (15.)


zie Roefell 4 deel plaat 2 figuur 2.

TAB. XVIII



H. Mearnsii. Torr.

BXX



N. Heerburgk fecit

Plaat 20.

Vlijfsel. Dit is een bij-foort of Batterd Vlijfsel.
Een Ridder-kapel die de wiken van boven bruin
heeft, met een blaauwen band in t midden en
binnen den rand veel rode vlakjes; van onderen
ligt bruin met gele vlakken en wederzyd op
de voorsten wiken orie, en op de agtersten
vier oogen. Houttuyn II Stuk bl. 201 (20.)
Deze kapel is alhier van boven afgebeeld,
en op plaat 14 van onderen, maar de egte
vlijfsel op plaat 42.

TABXX



N. Meisburg fecit

TAB XXI



N. Meerburch. fecit

Plaat. 21.

Thoäs. Ridderkapel die de wieren
gestaard en van boven bruin heeft, met
twee gele banden, van onderen met
bleek blaauwe plakken. Linn. Mantiss 536

TABXXI



N. Haenbuehl fecit

TABXXII



Plaat. 22.

Ricini. Geelrakkige Paanaal-kapel, die de
wieken langwerpig, ongekarteld bruin heeft. de
vrieten wederzijds met twee gele banden.
Houttuyn II Stuk II 232 (50.) Herbar. Sur. pl. 30.

Het mannetje heeft de wieken aan de grond.
steun blaauw, zie dezelve van boven op de plaat
vliegende; het wijfje de aagterstern van de
grondsteun of van 't lijf af, tot op de heft
vliegende en by Roefell 4 deel pl. 5. fig. 1
De Russen onthouden zig in suinaarne, op
het amerikaansch gewas *Ricinus* genaamt,
waar van de kapel de naam draagt.



N. H. Burroughs fecit



St. Albansensis fruit

Plaat 23.

Polimnia. Oranjeleurige Sarnat-kapel. Die
de wieken langwerpig, ongekarteld en bleekgeel heeft,
de wortlen met een geelen band, de agterflen met
drie zwarte banden Houttuyn II Stuk N. 231. (47.)
zie Roefel 4 deel pl. 5. figuur 2. uit Surinaame.



Fragaria virginiana Forst.

TAB XXIV



N. Hoenburg fecit

Plaat 2A

Pfidiu. Goyaren-kapel. Parna-kapel, die de
wieken langwerpig, ongekarteld, bruin heeft, de
voorflen met drie, de agterflen, met twee groen-
achtig doorschijnende banden: Houltuin II Stuk
n^o 233. (51) zie *Merian* *Levanaamfche infecten*
pl. 19. en *Roefel* II deel. pl. 2. figuur 3.



N. Hoenburgel fecit



Plaat 25.

Phasithoe. Parnaal-kapel, die de wieken lang
werpig ongekarteld en zwart heeft, met een wit-
vlakkeigen band, en drie witte stippen op de voorvleugelen.
Cinneut Sift nat 755.





N. Meenburgh fecit.

Plaat 26.

Omslag. Ridderkapel, die waken getand, kort
geflaart en zwart heeft, met een chroom geelen
band, de achtersten binnen den rand met zeren
geele dwars. streep en vier witte vlakjes daar
boven. zie deselve van onderen plaat 30.

TABXXVI



N. Meernburgk fecit.



N. Meerburch fecit.

Plaat 27.

Echion. een zwartachtig kapelletje of Pagetje.
die twee draadachtige staartjes heeft, aan de
achtersten vleugels, van onderen witachtig met
rode oogjes. Linneus Syst. Nat. 700.
zie voorgelyke by Plaatlijn H. 352. (126.)



N. Meurburg fecit.

TAB XXVIII





Plaat 20.

(Chrysippus. Ronf-kapel die de wieken rond-
agtig en bruinagtig geel heeft de worsten ieder
met acht witte vlakjes en een zwarten rand,
die wit gestippeld is. Linnéus Syst. Nat. 767

TAB XXVIII.



N. Mevburg fecit



N. Meerburg fecit

Plaat. 29.

Teucer: De Albat. Roderkapel, die de wieken
breed, en bleek bruinagtig heeft, van onderen
gewolkt; de agterflen met drie oogen, waar van
het laatste by uitslek groot is, zynde wel een halven
duim breed, en byna cirkel rond. Struikyn II Stuk
Pl. 216. (33.) & Merian Luunaamsche pifelen pl. 23.
De Rups leeft op de pifang, of Bannan, in wett indie.

TABXXIX



N. Meenburgh fecit



N. Meerburg fecit

Plaat 30.

Orestes. Ridder-kapel die de meken geland, kort
gestaart en zwart heeft, van onderen geel, met
een zwarten rand die met geel gestippeld is, om de
voorten, de agterflen mede geel, de buitenste heeft
zwart, waar in drie banden zijn, van half, maant-
wijze slakken, de binnenste rood, de middelste blauw,
en de buitenste geel, zie deze schone kapel
van boven plaat. 26.



N. Meerburch fecit

TAB XXXI



Plaat 31.

*Euterpe. Ponte Samat-kapel, die de meken
langwerpig, ongekarteld, zwart, met witte stippen
heeft en een geelen band. Houttuyn II Auk. bl. 232
(ag) komt uit Brett indiën.*

TAB XXXI



N. Meerburch fecit



A. Menziesii, f. v.

Plaat 32.

Agenor. Ridderkapel, met de wieken geland
en zwart, aan den grondsteun bloekleurig; de
rootten gestreept, de agtersten on + midden wit,
en agterwaards met vijf zwarte vlakken en
een geelen rande Houtklyn II Stuk Pl. 197. (13.)
men vind deze in Cott-indien en chinaw

TAB XXXII



A. Newburgh

TABXXXIII



N. Meerburch fecit

Plaat 33.

Cardamine L. Het Pieterfelie Beestje. Danaus-
kapel die de wicken rond van rand en wit heeft.
de voorsten ten halven oranje, de achtersten van
onderen groen gevulkt. Flouhuyn II Stuk II 260. (63)
zie het mannetje van boven bij de bloemen vliegen,
en het wijfje van onderen bij de plant aan de
boven zijde vliegende, en aan de onderzijde zittende
afgebeeld.

TABXXXIII



N. Meerburch fecit

TAB XXXIV



Plaat 34.

Scharfijal. Oott indisch Kapelletje of Pagetje.
die de vlecken met twee staarten, van boven
hemellich-blaauw, met een zwarten rand heeft,
van onderen blaauwagtig, met zwarte stippen.
zie Houduijn II Stuk . bl. 361. (129.) s kleermant
bijdragen op Roefel 1. deel. plaat 5. figuur. 1 en 2.
zie dit Kapelletje van onderen plaat 37.



N. Koenig fecit



N. M. esburg fecit

Plaat 35.

Dido. Annanias-kapel. Parnas-kapel, die
de wicken langwerpig ongekarteld zwart heeft,
de voorsten met groenachtige banden en vlakken,
de agtersten met blaauwachtige vlakken Linnéus
Syst. Nat. 782. zie Houttuyn Pl. 235 als een
byvoegsel onder (55.) & Herian Swin. Jafeden. pl. 2.



TAB XXXVI



N. Meunier fecit

Plaat 36.

Daphidice. Danaus-kapel die de wicken on-
gekarteld, rond van rand en wit heeft aan de
grondkleur blaauwaglig, met bruine zoomen, van
onderen geelagtig met wit gestrekt. Houttuyn
ii Stuk Pl. 249. (62.) zie dezelfde van boven
vliegende en van onderen zittende vertoond.

TAB XXXVI




N. Meunier scit



Plaat 37.

Marfijt. indiaansch Pagetje van boren
hemelblauw met een zwarten rand, van onderen
blauwragtig met zwarte stippen. Houttuyn is Stuk
H. 361. (129.) en Telemans bydragen op Roefel
i deel. plaat 5. figuur 1 en 2. deze kapel alhier
van onderen te zien is van boren verbeeld pl. 34.







N. Newburgh fecit

(Plaat 30. .

Wippelhoe. Een vuurkapelletje die de wicken
van boven van een vuurige rode kleur heeft, met
een bruinen rand, van onderen geel met witte
vlakken, met veel oogjes. Linnéus Syst Nat 1793.
Deze behoort tot de sierlijke Danant-kapellen
te behooren. zie Hüttig II Stuk II. 372. (161.)

TAB XXXVIII



N. Hensburgh fecit

TAB XXXIX



N. Heerburg's fest

Plaat. 39.

Clio Parnai-kapel. die de wieken langwerpig,
ongekarteld bruin heeft, de voorsten wit geslakt.
de agterflen met een wit landoeriel. Houttuyn
ii Stuk. Plaat 234. (52) & Merian Surinaamsehe
insecten: plaat 35. van onderen vliegende vertoond.

TAB XXXIX



N. Meuburg fecit

TAB XXXX



Plaat 40.

Antiochus. West-indische koninginne Pagie.
Ridder kapel. die de wiken gestaart, en weder.
zijds geel heeft zwart gebandeerd en gerand,
met witte staarten, die 10 lang zijn als de
wiek. Houttuyn II. Pluk. Plank 209. (20.)

TAB XXXX



Dr. Keenburgh fecit





N. M. aenborge fecit.


Plaat 41.

Polixena. Ridderkapel, die de wieken getand en purperkleurig heeft, met een breed zwarten rand, of de wieken zwart, met een grooten purpere vlak in t midden van elke wiek; van onderen gevulkt. Looft uit America

TAB XXXI



N. M. aemburg fecit



TAB XXXII



N. Heerburg's feast


Plaat 42.

Vlijsses. Ridderkapel, die de wieken gestaat heeft, zwart van kleur met een gestraalde hemelblauwe plek; de agtersten van onder met zeren oogjes geteekend. *Kruittuyn II Stuk* Pl. 201. (20.) deze kapel heeft de zeren lancetwijze evenwijdige bruine vlakken die in het zwarte deel der wieken en in de hemelblauwe vlak inschieten, en het kenmerk van de *vlijsses* uitmaken. De Kapellen op plaat 1A en 20 schijnen derhalven een bijoot van de *vlijsses* te zijn.

TAB XXXII



N. Kierling's fecit



TAB XXXXIII




Plaat 43.

Skollina. Ridderkapel, die de wiken
getand, enigzintt gestaart en zwart heeft,
met een blaauwen band.
wond in Asia en China.



N. Merborge fecit





N. Meerburch fecit

Plaat 44.


Philea. oost-indische Citroen-kapel,
of Oranje-kapel. Danaüs-kapel, die de
wieken ongekarteld hoekig en citroen geel heeft
de voeten met een oranje kleurige plek en
de achtersten met een dergelyken breeden rand
Linnéus Syst. Nat. 764. & Roefel 1 deel
plaat 3. figuur 5.

TAB XXXXIV



N. Meerburch fecit

TABXLV



11 Meerburg's feet

Plaat 45.

Dirce. Nijf-kapel, die de muren hoekig
heeft en bruin, de voorsten met een geelen
band, van onderen geel met zwart gegolft.
Houttuyn II Stuk H. 325. 117.) deze kapel heeft
reel overeenkomst met de Batel. of het Esse-
quebich Kapelletje of pagie, zo het dezelve
niet is by Houttuyn H. 301. (169.) plaat 09. fig. 9.
zie dezelve aan de boven en onderzijde liggende

TABXLV



11 Meerburg's fruit

TAB XLVI



Plaat 46.

Bixa. Karolijnisch kappelletje dat de ricken rondagtig en bruin, aan den grondsteun groen heeft; de agtersten van onderen met een melkwetten band, Dit kappelletje heeft de sprielen haakig, als een half slag van Dag en Nacht-kapellen. Flouittuyn. II. Deel. Pl. 377. (165.) zie Merian Suuraamsche insecten plaat. 44.

TAB XLVI



N. Meerburch fecit

1875



1875

LVII



N. Mercurius fecit.


Plaat 47.

Phidiast. Oost-indisch Dik-kopje, dat de
wieken rondagtig, glinsterend zwart met witte
randen heeft, den bek en aars rood. Houltuyn
ii Stuk H. 377. (164.) zie en drie zo aan de
boven als onderzijde, liggende, vertoont.

TAB XLVII



N. Mearns fecit



XLVIII



N. Meerburg fecit

Plaat 40

Aoni. Gewolkte Chinese Paauw-oog.
Vormf. kapel, die de wiken hoekig heeft en
graauw, de voortlen geelachtig gewolkt; van 2
boren met anderhalf oogjes geteekend.
(Houttuyn II. Pluk. H. 205. (91.))

XLVIII



N. Meunier fecit



Plaat 49.

Quercus. Pagietje van de Eikenboomen,
kapelletje dat de wicker eenigermate gestaart
en van boven glauw heeft, van onderen afgrauwt
met een witte streep en twee oranjekeurig
stippen by den aars. zie er op de plaat twee
eenigzint! onderscheiden vliegende, en een op
een blad zittende. Houttuyn II Stuk bladzijde
359 (120.) en P. Admiraal noemt ze de Zorgeloor.



N. Hurlburg fecit

TABL



N. Meerburg & Fecit

Plaat 50

Dejanira. Rofse of Bruine Argus een
Nimf-kapel, die de wieken getand en bruin heeft
de borenflen ieder met vijf oogjes van onderen
geelagtig gewolkt met een witten band, waar in
op de voorflen zeren en op de agterflen vijf of
zes oogjes staan Linnéus Syst. Nat. 774.
zie bij Ploutkyn II Stuk. bl. 200. 291. 294.
296—299 onderfcheidene foorten van Argus


TABL



N. Meunier & Fecit



TAB LI



N. Neuburg & fecit

Plaat 51.

Caricae. Oranje-kleurig (of geel) Kapelletje
dat de wiken ongekarteld en Oranje-kleurig heeft,
met een gemeene witte plek op 't midden, den
rand afgraauw gevoegd. Houttuyn II Stuk bl.
372 (150.) & Merian Suin. insecten plaat 40.
figuur 1. Dit Kapelletje onthoudt zig op de
Papaija-boomen te Suriname.

TAB LI



N. Neerburg & fecit



TAB LII



Plaat 52.

Annathéa. Nijf kappel, die de wuiken hoe-
keg heeft, van boven bruin met witte flippers,
een roodem of geelē band en een zwarte
gegolfsde streep. woont in de pidiën. zie
Houttuyn II Stuk Pl. 325. (1102)

Deze kappel, slynt een verscheidenheid te zijn
van de *Annathéa*. zie de volgende plaat.

TAB LII



Nicolaas Kerburg fecit

11 (E) 7



Hand-drawn



N. Menzies fecit

Plaat 53.

Amathia. Wimp-kapel. die de wieken hoekig heeft, van boven bruin, met witte stippen, een rooden band, en een zwarte gegolfde streep.

Houttuyn H. 325 (110.) zie een ander soort van Amathia. op de vorige plaat.

Deze kapel is van onderen ruig geel met een bruinen band, zie dezelfde op een blad zittende, en aan de bovenzijde vliegende verbeeld.

TAB LIII



N. Meiburg fecit



TAB: LIV



N. Meenbuhl fecht

Plaat 54.

Tephüs. kapel, die de wiken eenigermaten ge-
staart en van boven zwart heeft, de wortlen met
twee witte vlakken, de agtersten met een witte
rood gerande plek. De wiken hebben boven
dien witte stippen aan den rand, en de wortlen
zyn, van onderen rood geaderd. Flouttuyne
ii Stuk. Pl. 302. (170.) onder de ongeschikte kapel-
len.

TAB: LIV



N. Meenburch fecit



TAB LV



Plaat 55.

Oenone. Blaauw-slakkige Chinese Kapel.
Nimf-kapel, die de wicken gekarteld heeft, de voor-
sten witagtig gerlakt, (liefst geel met breede donker
bruine randen.) met twee kleine oogjes; de agter-
sten met een hemel-blaauwe plek, met twee oogjes
geteekend. dog sommige dezer kapellen hebben
groene oogjes. men betrekt deze tot de Chinese
Paauzen. Houttuyn II stuk. bladzij 205 (92.)

TAB LV



N. Meerburg & fecit



